



Atenção: contém 252,750 mg de Lactose /unidade farmacotécnica ou unidade de medida.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Número de lote, data de fabricação e de validade: vide embalagem.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Este medicamento se apresenta na forma de comprimido orodispersível, que se desintegra ou se dissolve rapidamente quando colocado sobre a língua, sem a ingestão de água. É importante deixar o comprimido dissolver sobre a língua. Não mastigar ou engolir por inteiro. Não é recomendada a ingestão de FUMASIL® junto com as refeições. Deve ser ingerido, preferencialmente, meia hora antes ou depois da refeição.

A dose recomendada e a duração do tratamento dependem da resposta individual de cada paciente ao tratamento. Porém, é geralmente recomendada a manutenção do tratamento até a diminuição dos sintomas. Segue esquema posológico de uso adulto sugerido como referência.

1º dia de tratamento:

1 comprimido a cada 1 hora por via oral.

2º dia de tratamento:
1 comprimido a cada 2 horas por via oral.

3º dia de tratamento:
1 comprimido a cada 3 horas por via oral.

4º dia de tratamento:
1 comprimido a cada 4 horas por via oral.

5º dia de tratamento:
1 comprimido a cada 5 horas por via oral.

6º dia de tratamento:
1 comprimido a cada 6 horas por via oral.
Após o 6º dia de tratamento:
manter a posologia de 1 comprimido a cada
6 horas por via oral.

Não é necessário o uso de Fumasil no período em que estiver dormindo. Você pode aumentar a dose caso sinta necessidade, caso isso aconteça, apenas recomendamos não exceder a quantidade de 18 comprimidos ao dia.

Recomenda-se manter a posologia de 1 comprimido a cada 6 horas por um período mínimo de 90 dias ou até o completo abandono do fumo.

Apresentações
Embalagem contendo 60

USO ORAL • USO ADULTO

Cada comprimido de 300 mg contém:

<i>Argentum nitricum</i>	7 DH.....	0,0075 mL
<i>Caladium seguinum</i>	20 DH.....	0,0075 mL
<i>Lobelia inflata</i>	4 DH.....	0,0075 mL
<i>Plantago major</i>	4 DH.....	0,0075 mL
Excipiente q.s.p.....		300 mg

Excipiente: lactose monoidratada, amido pré-gelatinizado e estearato de magnésio.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

“As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.”

FUMASIL® é um medicamento homeopático indicado para auxiliar no combate ao tabagismo.

Medicamentos homeopáticos são indicados segundo a individualidade de cada paciente, e não para doenças específicas. A dose do medicamento homeopático é individualizada para cada paciente.

Quando o paciente for hipersensível aos componentes da fórmula.

Não foram relatadas, até o momento, contraindicações ao uso do medicamento FUMASIL®.

Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista (categoria “C”).

Não é recomendada a ingestão de FUMASIL® junto com as refeições. Deve ser ingerido, preferencialmente, meia hora antes ou depois da refeição. Não foram relatados, até o momento, efeitos secundários conhecidos do FUMASIL®. Caso suspeite de algum efeito colateral após ingerir FUMASIL®, por favor, informe ao seu médico ou farmacêutico.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu prescritor se estiver amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião dentista.

REFERÊNCIA DE COR

Preto

CÓDIGO ANTIGO

500007350/22-00

CODIGO NOVO

500008114/24-00

“Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 90 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.”

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvida sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nenhum efeito prejudicial deve ser esperado se você interromper pontualmente a administração de Fumasil®.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico, ou de seu médico, ou cirurgião dentista.

Caso você se esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Você pode tomar a dose recomendada deste medicamento assim que se lembrar.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião dentista. Não foram realizados estudos em animais ou em mulheres grávidas. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento. Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A melhor conduta em uma situação destas é a de esperar e observar. Aumente a ingestão de líquidos. Caso ocorram vômitos, enjoos ou qualquer outro sintoma perceptível procure uma ajuda emergencial médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

MEDICAMENTO DINAMIZADO NOTIFICADO

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde



REFERENCIA DE COR

Preto

CÓDIGO ANTIGO

500007350/22-00

CÓDIGO NOVO

500008114/24-00



CONHEÇA COMO FUNCIONA FUMASIL:



DIZERES LEGAIS

Farm. Resp.:
Dra. Marcia Weiss I. Campos
CRF-RJ nº 4499



Notificado e Produzido por:
FARMOQUÍMICA S/A
Rua Viúva Claudio, 300, Jacaré
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20970-032
CNPJ: 33.349.473/0003-10

0800 025 0110
sac@fqm.com.br



Esta bula foi atualizada em 04/11/2022.



500008114/24-00
BU AB 150X400 mm
PH 65745
AR021223